Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického léčebného programu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Propranolol 80 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním
Propranolol 160 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním

CÍL SPECIFICKÉHO LÉČEBNÉHO PROGRAMU

Zajištění léčivého přípravku s léčivou látkou propranolol-hydrochlorid k léčbě dospělých pacientů s esenciálním tremorem.
SpLP je schválený Ministerstvem Zdravotnictví; č. j.: MZDR 25663/2024-8/OLZP.

PŘEDEPISOVÁNÍ

- **Na receptu je třeba označit „neregistrovaný LP"** (najdete v místě „Pole pro symboly", kde běžně zaškrtáváte nezaměňovat, označte „neregistrovaný LP").
- Předepsání či použití léčivého přípravku v rámci specifického léčebného programu není třeba hlásit na SÚKL.
- Ošetřující lékař je povinen informovat pacienta o skutečnosti, že je mu podán neregistrovaný léčivý přípravek v rámci specifického léčebného programu.

CENA A ÚHRADA

Úhrada zdravotní pojišťovnou dosud nebyla stanovena.

SÚKL kód	Název léčivého přípravku	Cena	SPC
284404	**Propranolol SRC 80 mg; 28 cps**	**438,70 Kč**	
284405	**Propranolol SRC 160 mg; 28 cps**	**600,81 Kč**	

DÁVKOVÁNÍ

- U většiny pacientů je dosaženo adekvátní kontroly při léčbě jednou tobolkou přípravku Propranolol 80 mg denně (buď ráno nebo večer).
- V případě potřeby lze dosáhnout další kontroly zvyšováním dávky po 80 mg (po jedné 80 mg tobolce) na maximální dávku 240 mg denně, užívanou buď ráno nebo večer, kterou lze podávat v nejvhodnější formě pomocí přípravku Propranolol 160 mg nebo 80 mg tobolky.
- Maximální hladiny v krvi je u formy s řízeným uvolňováním dosaženo po 5 hodinách.

LÉKOVÁ FORMA

Tobolka s prodlouženým uvolňováním. Potahová vrstva mikrogranulí zajišťuje postupné uvolňování léčivé látky a umožňuje 24hodinový účinek.

Retardovaná léková forma zajišťuje vyrovnanější hladiny léku v krvi.

Perucca Br. J. Clin. Pharmac. 1984;18:37-43.

INDIKACE

Léčba esenciálního třesu dospělých pacientů

Jedná se o 1. linii léčby.



Adaptováno dle: Hopfner F, Deuschl G. Managing Essential Tremor. Neurotherapeutics 2020;17:1603–1621. https://doi.org/10.1007/s13311-020-00899-2.

HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

- Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Šrobárova 48
  100 41 Praha 10
- Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek